核准日期:2007年10月26日

修改日期:2010年10月01日

修改日期:2014年10月26日

【成分】本品为无色澄清液体。

每1ml含:

甘露醇 0.25g

氯化钠(NaCl)0.9g。

【性状】本品为无色澄清液体。

【适应症】用于脑水肿、颅内压增高、脑水肿、颅内压增高及伴发脑缺血、脑梗死、脑出血、脑外伤、脑肿瘤、脑膜炎、脑炎、脑缺氧、脑外科手术

重心脏负荷，诱发或加重心力衰竭。

6.长期使用强心苷类药物可蓄积中毒，导致心脏骤停。

7.甲状腺功能亢进症、缺血性心脏病、洋地黄中毒、低钾血症、低镁血症、高钙血症、窦性心动过缓、变色、结节等药物性认仪

8.对洋地黄糖苷类药物过敏者禁用，发现药物出现中毒反应时，应立即停药。

9.对洋地黄糖苷类药物过敏者禁用，发现药物出现中毒反应时，应立即停药。

10.应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

11.应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

12.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

13.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

14.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

15.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

16.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

17.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

18.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

19.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

20.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

21.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

22.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

23.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

24.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

25.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

26.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

27.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

28.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

29.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

30.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

31.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

32.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

33.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

34.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

35.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

36.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

37.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

38.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

39.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

40.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

41.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

42.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

43.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

44.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

45.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

46.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

47.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

48.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

49.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。

50.对于男性糖尿病患者，应定期检查血常规、肝功能、肾功能、电解质等指标，发现异常应及时调整剂量或停药。